

茶病虫害防除情報

令和 8 年 8 月 12 日

【第 8 号】

鹿児島県経済連・肥料農薬課

大切な秋芽の充実を図る

秋芽生育期の病虫害防除対策

秋芽生育期には主要な病虫害が多発生します。これらの病虫害は秋芽の生育充実を損ない、来年一番茶の収量・品質に大きく影響します。また、発生した病虫害は発生源となり、来年の発生量も左右します。この時期は労力には比較的ゆとりがあり、農薬の使用制約も少ないので入念な防除に努めましょう。二番茶後の浅刈り、深刈りなど更新園が見られ、秋芽の生育は様々ですので芽の生育状態に合わせた防除を心掛けます。

- ☆ 発生する病虫害・・・炭疽病 新梢枯死症 網もち病 チャノミドリヒメコバイ チャノキイロアザミウマ チャノホリカ ハキミシ類 シクトリミシ類 チャノホリダニ カンザワハダニ マダラカサハラムシ チャトゲコジラミなど
- ☆ 防除のすすめ方・・・秋芽生育期間中の被害を防ぐように 1 回目・萌芽～1 葉期、2 回目・3～4 葉期に混用散布による体系防除と補完防除で、総合的に病虫害を防除します。品種、更新園などで芽の生育が異なるので生育に合わせた防除をします。

☆ 病虫害の発生と防除のポイント

炭疽病・・・やや多 新梢枯死病・・・少 網もち病・・・やや少

降雨や多湿条件で生育中の秋芽の軟らかい新葉が感染しますので、秋芽生育期の天候に留意し、予防防除に努めましょう。基本的には萌芽～1 葉期に予防効果のある薬剤、3～4 葉期に治療効果のある DMI 系薬剤を散布して防除します。なお網もち病の発病の恐れのある茶園は生育後半に銅水和剤を、新梢枯死症はストロビル系薬剤を 2 葉期頃に補完散布すると的確に防除できます。

チャノホリカ・・・多 チャノコクモンハマキ・・・並 チャハマキ・・・並

チャノホリカは第 4・5 世代、ハマキミシ類は第 3・4 世代の発生で、多発することがあります。いずれも若齢幼虫期をねらい体系防除でも防除されることがありますが、多い場合や発生時期が合わない場合には専用剤で補完防除します。モギエダシキは局部的に発生がみられるので、発生を確認し、若齢幼虫期に防除します。

チャノミドリヒメコバイ・・・やや多 チャノキイロアザミウマ・・・少

今年の三番茶までの発生は、チャノミドリヒメコバイはほぼ平年並み、チャノキイロアザミウマは柄何よりも少ない傾向でした。今後、乾燥した晴天が続くと急激に増殖し、秋芽の生育期は最も被害を受ける恐れがあります。特に萌芽～生育初期の加害で被害が大きくなるため防除は遅れないようにします。増殖が速いため、残効性の長い薬剤で、2 回防除が必要です。一部地域で増加しているマダラカサハラムシは萌芽・生育初期に同時防除します。

カンザワハダニ・・・多

最近カンザワハダニは更新園などに一時的に多発生することが多く、防除が必要です。また、チャトゲコジラミは県内全域に発生が拡大している状況ですので、第 3 世代幼虫を若齢期に体系防除の 2 回目で同時防除します。

☆ 防 除 対 策

表 1 秋芽生育期の病虫害基幹防除体系による防除法（米国輸出茶対応）

月 旬	茶芽生育過程 (発生時期)	病虫害名	基幹防除	補完防除
			薬 剤	薬 剤
8 月上中 下	秋芽萌芽ー1 葉期	炭疽病 新梢枯死症 ウンカ スリップス ハマキ類 ホソカ マダラ チャトケ	フロンザイト SC グレース乳剤（南日北肝熊） コテツフロアブル（始）	
	秋芽 3ー4 葉期	炭疽病 網もち病 ウンカ スリップス ハダニ チャトケ マダラ	インターフロアブル コテツフロアブル（南日北肝熊） or アグリメック（始）	
9 月 上 中	3-4 葉期 7 日後	（網もち病）		ムッシュボルトー（南始肝） or クプロシルト（日北）
	若齢幼虫発生期	ハマキムシ類 ホソカ シャクトリ スリップス	アファーム乳剤（南） or デリアナ SC（日）	ファルコンフロアブル（北） or デリアナ SC（始熊） or アファーム乳剤（肝）

表 2 秋芽生育期の病虫害基幹防除体系による防除法（一般園茶栽培暦）

月 旬	茶生育過程 (発生時期)	病虫害名	基幹防除	補完防除
			薬 剤	薬 剤
8 月 上 中 下	最終摘採・整枝後 (直後～3 日後)	輪斑病	カスミンボルトー(始)	
	秋芽萌芽ー1 葉期	ウンカ スリップス チャトケ ハダニ 炭疽病 網もち病 もち病 新梢枯死症	コテツフロアブル（始曾） タコニール 1000（始曾）	
9 月 上 中	秋芽 3ー4 葉期	炭疽病 網もち病 もち病 新梢枯死症 ウンカ スリップス チャトケ	インターフロアブル（始曾） アグリメック（始曾）	
	秋芽 4ー5 葉期	（網もち病常発園） （ハマキ ホソカ シャクトリ）		ムッシュボルトー（始） ジブトールフロアブル（曾） デリアナ SC（始） ファルコンフロアブル（曾）

秋芽生育期農薬散布時期の芽の生育状況



秋芽 1 回目散布（萌芽～1 葉期）



秋芽 2 回目散布（3～4 葉期）